



澳門大學

UNIVERSIDADE DE MACAU
UNIVERSITY OF MACAU

體格檢查指引

1. 對象

- 1.1 所有錄取入讀本校學士學位課程之新生及復學生必須持本校提供之「體格檢查報告表」(REG/Form/014)並按照以下第二點要求,到相關醫療單位進行體格檢查(以下簡稱「體檢」)。
- 1.2 「體格檢查報告表」有效期為三個月。建議經「校長推薦入學」獲錄取之學生可於五月下旬前往辦理體檢。
- 1.3 豁免
如於本校指定之註冊期前三個月內,曾在「澳門衛生中心」或「澳門鏡湖醫院」進行體格檢查者,可豁免進行體檢。但有關學生必須持本校提供之「體格檢查報告表」(REG/Form/014)至辦理體檢的「澳門衛生中心」或「澳門鏡湖醫院」,要求把有關資料轉載至本校之「體格檢查報告表」內。

2. 體檢地點

- 本地學生:可選擇到「澳門衛生中心」或「澳門鏡湖醫院」進行體檢。
- 內地學生:必須到「澳門鏡湖醫院」進行體檢。
- 非本地學生(內地學生除外):到原居地之政府醫療機構、「澳門衛生中心」或「澳門鏡湖醫院」進行體檢。

注意:到「澳門衛生中心」或「澳門鏡湖醫院」進行體檢前,請細閱以下程序:

澳 門 衛 生 中 心	澳 門 鏡 湖 醫 院
<p>步驟 1: 學生必須先到位於澳門得勝馬路 40 號之衛生局結核病防治中心(電話:(853) 2853 2196)作胸部 X 光片檢查。</p> <p>步驟 2: 取得報告後,於預約時間帶同「體格檢查報告表」及疫苗接種記錄(即「個人接種手冊」或「疫苗接種卡」)到所屬堂區之衛生中心進行體檢。「體格檢查報告表」之第一部份必須在醫生面前填寫。</p>	<p>✓ 學生可自費到鏡湖醫院辦理體檢,所需手續可致電(853) 8295 8501 或(853) 8295 8502 查詢。</p> <p>✓ 學生必須帶備「體格檢查報告表」及疫苗接種記錄(即「個人接種手冊」或「疫苗接種卡」)進行體檢。「體格檢查報告表」之第一部份必須在醫生面前填寫。</p>
學生應儘早到有關單位排期辦理體檢手續,以免延誤入學手續及開課。	

3. 註冊時應遞交之體檢文件

- ☑ 填妥之「體格檢查報告表」(「體格檢查報告表」有效期為三個月。表格上必須具有辦理體檢的醫院或衛生中心之蓋章及醫生簽名方為有效。);及
- ☑ 疫苗接種記錄(即「個人接種手冊」或「疫苗接種卡」)之影印本 – 包括個人資料頁及有效之疫苗接種記錄(所須接種之疫苗請參閱背面之列表。請於遞交體檢報告時帶備疫苗接種記錄正本,以備需要時檢查)。

◆ 此「體格檢查報告表」只適用於入讀澳門大學之學生。校方有權查核學生之身體狀況以確認是否適合入讀本校課程。(學生必須遞交「體格檢查報告表」以辦理入學註冊手續,否則不獲准上課。)

4. 查詢

	澳門大學醫療中心	註冊處
電話:	(853) 8822 8852	(853) 8822 4007
電子郵箱:	hseo.health_care@um.edu.mo	registry@um.edu.mo
地址:	中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學 澳大綜合體育館 N8 地下 G002 室	中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學 行政樓 N6 地下 G002 室



澳門大學

UNIVERSIDADE DE MACAU
UNIVERSITY OF MACAU

前往澳門鏡湖醫院進行體檢應注意事項

- 請帶齊以下資料：
 - 身份證或護照；
 - 近照一張；
 - 澳門大學「體格檢查報告表」；
 - 疫苗接種記錄（即「個人接種手冊」或「疫苗接種卡」）。
- 配戴隱形眼鏡者，檢查前請轉戴有框眼鏡。
- 月經期間不能作尿液檢查，經期完結三天後方可作尿液檢查。
- 懷孕期間不能作 X 光檢查。
- 胸部 X 光檢查須在澳門鏡湖醫院進行。
- 澳門鏡湖醫院健康檢查中心地址、聯絡資料及辦公時間如下：
地址：澳門連勝街鏡湖醫院第一門診大樓五樓
電話：(853) 8295 8501, (853) 8295 8502
傳真：(853) 8295 8512
電郵：health@kwh.org.mo
辦公時間：星期一至六 08:00-13:00, 15:00-18:00, 星期日及公眾假期休息

遞交疫苗接種記錄注意事項

應澳門特區政府衛生局對高等院校學生防疫接種制度的指引，學生於註冊入學時須提交以下疫苗接種記錄。

項目	必須完成劑數	備註
1. 含麻疹疫苗	至少 2 劑	僅適用於 1970 年起出生者，2 劑之間須相隔至少 4 周。
2. 含德國麻疹（風疹）	至少 1 劑	僅適用於 1970 年起出生者。
3. 含破傷風疫苗	至少 3 劑	每劑之間須相隔至少 4 周，且最後一劑在最近 10 年接種。
4. 含白喉、百日咳疫苗	至少 1 劑	--
5. 含脊髓灰質炎疫苗	至少 4 劑	<ul style="list-style-type: none">僅適用於來自巴基斯坦、尼日利亞和阿富汗的學生。每劑之間須相隔至少 4 周。